

## КАК ПРИГОТОВИТЬ РАСТВОР ПРЕПАРАТА МОВИПРЕП®

### Приготовление 1-го л раствора препарата:

1. Содержимое 1 пакетика (саше) **А** и 1 пакетика **Б** развести в небольшом количестве воды до полного растворения.
2. Довести до 1 л водой.
3. Хорошо перемешать.



### Приготовление 2-го л раствора препарата:

Повторить алгоритм, используя оставшиеся пакетики **А** и **Б**.

## ВАЖНАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЁМУ РАСТВОРА ПРЕПАРАТА:

- Раствор препарата **принимать дробно, по 250 мл каждые 15 минут.**
- Во время приёма раствора препарата нужно **соблюдать двигательную активность:** ходить, выполнять круговые движения корпусом, наклоны в стороны, вперёд-назад, приседания.
- Препарат начинает действовать индивидуально: **в среднем через 1–2 часа от начала приёма появляется первый стул.**
- Активное действие препарата продолжается индивидуально: **в среднем в течение 2 часов.**
- В это время будет интенсивный жидкий стул в среднем 12–15 раз (зависит от индивидуальных особенностей пациента).
- К моменту окончания подготовки стул **должен измениться на прозрачную бесцветную или слегка окрашенную жидкость**, что свидетельствует о готовности к обследованию.
- Необходимо рассчитать соответствующий временной интервал для поездки в клинику.
- **Запрещено уменьшать объём жидкости для приготовления раствора МОВИПРЕП®.**
- Объём дополнительной жидкости (помимо раствора МОВИПРЕП®) **1 л, уменьшать который нельзя.** Если пациент хочет пить, то объём дополнительной разрешённой жидкости не ограничен.
- При **специфическом вкусовом восприятии** препарата можно пить раствор охлаждённым, через коктейльную трубочку (соломинку), в промежутках пить или запивать раствор небольшим количеством воды, сладкого чая, а также рассасывать леденцовую карамель (леденцы типа «барбарисок»), мёд, лимон и т.д.
- От момента окончания приёма препарата МОВИПРЕП® до обследования должно пройти **как минимум 1–2 часа и как максимум 4 часа.**
- **Прекратить приём всех жидкостей следует не позже чем за 2 часа до обследования.**
- Не требуется дополнительно (или вместо) проводить процедуру очищения толстой кишки клизмами.
- Для предотвращения образования пены в кишечнике рекомендуется **в последний стакан дополнительной жидкости добавить пеногаситель** – ¼ флакона эмульсии симетикона (сироп, т.е. жидкая форма! Не таблетки и не капсулы!) Эспумизана (или Боботика, или Саб Симплекса).